衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

HPV疫苗知多少

懶人包



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

HPV是一種會引起多種癌症的病毒

- 人類乳突病毒 (Human Papillomavirus,簡稱HPV) 是一種DNA病毒，多達兩百多型。
- 可分為低危險型和高危險型
  - 常見低危險型：HPV 第6、11型，感染可能造成尖形濕疣(俗稱菜花)。
  - 常見高危險型：HPV 第16、18、31、33、45、52、58型等，若持續或重複感染，可能發展成子宮頸癌、肛門癌、人類外生殖器癌(如陰莖癌、陰道癌)及口咽癌等疾病。



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

誰容易感染到HPV?



- 無論何種性別，每個人一生中約有50-90% 的機會感染到HPV。
- HPV主要傳染途徑為性接觸，因此開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。
- 不安全性行為、非單一性伴侶以及長期免疫力低落等情況，也會增加HPV 的感染風險。



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

3道防線預防HPV感染及相關癌症

1 良好的生活形態與安全性行為

2 接種人類乳突病毒(HPV)疫苗



3 定期做子宮頸抹片檢查

姊姊妹妹
限定！



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare

認識HPV疫苗

我國食品藥物管理署已核准的3種HPV疫苗

疫苗名稱	保蓓(二價)Cervarix®		嘉喜(四價)Gardasil®		嘉喜(九價)Gardasil 9®	
適用對象	9-14 歲女性	15 歲以上女性	9-13 歲女性	14-45 歲女性 9-26 歲男性	9-14 歲男、女性	15-45 歲男、女性
接種劑數	2 劑 *	3 劑	2 劑 *	3 劑	2 劑 *	3 劑
第 1 劑	第 0 個月		第 0 個月		第 0 個月	
第 2 劑	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 1 個月	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月
第 3 劑	X	第 1 劑後 6 個月	X	第 2 劑後 4 個月	X	第 2 劑後 4 個月
適應症預防型別	HPV 第 16、18 型		HPV 第 6、11、16、18 型		HPV 第 6、11、16、18、31、33、45、52、58 型	

- 請按仿單建議的劑數與間隔完整接種



完整仿單請掃描
QR Code

我要接種2劑還是3劑HPV疫苗？

嘉喜 (九價)Gardasil 9®	
9-14 歲 男、女性	15-45 歲 男、女性
2 劑 *	3 劑
第 0 個月	
第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月
X	第 2 劑後 4 個月
HPV 第 6、11、16、18、31、33、45、52、58 型	

目前公費對象接種**<u>九價HPV疫苗</u>**

9-14歲者接種2劑，第1劑與第2劑間隔 6 個月以上。



15-45歲則打 3 劑，第1劑與第2劑間隔 2 個月以上，第2劑與第3劑間隔 4 個月以上。



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

HPV疫苗接種對象？要去哪裡接種？

公費對象

- 公費對象為我國國中二年級學生，採**校園集中**方式接種。
- 若因故無法配合校園接種，接種單位會發**補接種通知單**，可配合一定期限內前往**合約院所**接種疫苗。

QR Code
合約院所



自費對象

- 自費對象可就近洽詢醫療院所預約接種。



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare



接種注意事項

接種前

1、詳讀衛教說明

2、簽署同意書



接種中

1、主動告知病史或特殊狀況

2、量體溫

3、醫師評估適合接種與否





接種後

1、原地休息15分鐘再離開

2、現場若有不良反應，請通知醫療人員處理

3、離開後若有嚴重或非預期之不適感，請儘速前往醫療機構

衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

HPV疫苗常見Q&A



Q: HPV疫苗對HPV相關癌症的保護力是百分之百嗎？

A: 因疫苗的涵蓋價數不同，理論上可以預防70%以上的HPV感染，無法百分之百預防子宮頸、頭頸及人類外生殖器等相關癌症唷！

Q: HPV疫苗的保護力可以持續多久呢？




A: 保護力**至少10年**，長期保護力仍須持續觀察。

衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

HPV疫苗常見Q&A

Q: 什麼時機接種HPV疫苗最有效？

A: HPV 疫苗對於性行為尚未活躍或未受到HPV感染者最有效，但有性行為經驗者仍可接種。



Q: 接種HPV疫苗能夠治療HPV感染嗎？

A: 疫苗屬於預防手段，主要是藉由「**防止HPV病毒感染**」來預防相關疾病，**疫苗本身不具治療功效**。

衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

HPV疫苗安全性

HPV疫苗可否和其他疫苗，如COVID-19疫苗同時接種?

可以，HPV疫苗是非活性疫苗，可與其他例如A、B型肝炎、白喉、破傷風、無細胞百日咳、非活性小兒麻痺、腦膜炎雙球菌及COVID-19等疫苗**同時接種**。



記得要先經由醫師評估，且**接種部位要分開**唷！



衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

接種HPV疫苗可能有什麼不良反應？

- 常見不良反應：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩等。
- 少見不良反應：腹瀉、皮疹、蕁麻疹、關節痛、昏厥等。
- 若接種後有任何不適，請儘速就醫，亦可撥打諮詢專線。



HPV疫苗服務專線
0800-88-3513



請在詳閱衛教說明後與孩子一同簽署接種同意書，男孩女孩齊接種，癌症快快遠離我！



更多資訊請參考
國民健康署 HPV專欄

衛生福利部
國民健康署
Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

臺北市公共衛生師公會
TPHSA

委託臺北市公共衛生師公會 製作